

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十

明 周王朱櫛 撰

婦人諸疾門

崩前漏下

治漏下去血不止方

出千金方

取水蛭治下篩酒服一錢許日二惡血消即愈

治女子漏下積年不斷困馬方

出千金方

取鵲重巢柴燒灰作末服方寸匕日三服三十日

愈甚良重巢者鵲去年在巢中產今年又在上作
重巢產者是也一方酒調下食前

治婦人漏下

出本草

用水蘇莖葉煎取汁飲之

治婦人漏下不斷方亦治崩中赤白不止氣虛竭方

出千金

金方

以亂髮皂莢水洗燒為細末空心溫服酒調下一

錢

又方

出千金方

用鹿茸燒灰細研食前溫酒調下二錢亦可治漏下赤色令人黃瘦虛竭

又方

出千金方

用桃仁燒灰細研食前溫酒調下二錢亦可治漏下赤色

治血內漏下

用蒲黃二兩水服方寸匕立止

血露不絕方

用竈突墨酒服一七日三服效

治血下不止產後崩中及治胎動腰痛搶心

用蒲黃三兩酒五升煮取二升分三服食前

又方

以燒桑白皮水煮飲之

治卒漏血欲死方

以煮鷄蘇一斗常服之亦可

又方

出肘後方

用烏賊魚骨五分桑耳五分為末酒服匕一日三

服

慎火草散

出千金方

治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令

人面黑無顏色皮肉相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脇腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能久立每嗜卧困懶

慎火草

白石脂

禹餘糧

鱉甲

乾薑

細辛

當歸

芍藥

石斛

芍藥

牡蠣

各二兩

黃連

薔薇根皮

乾地黄

各四兩

熟艾

桂心

各一兩

右治下篩空腹酒服方寸匕日三稍加至二匕若

寒多者加附子椒熱多者加知母黃芩各一兩白

多者加乾薑白石脂赤多者加桂心艾各二兩

薔薇根皮散

出聖惠方

治婦人崩中漏下赤白青黑腐臭不

可近令人面黑皮骨相連月經失度往來無常小腹弦

急或時腹內疴痛不欲飲食

薔薇根皮

剉一兩

慎火草

半兩

白薇

三兩

敗龜

一兩

塗酥炙全黃

黃連

一兩去須炒

乾薑

半兩炮裂剉

桂心

半兩

細

辛

半兩

當歸

一兩剉微炒

熟乾地黄

一兩

芎藭

半兩

石斛

一兩去根剉

白芍藥

半兩

牡蠣

二兩為粉

禹餘糧

二兩

燒醋淬七遍

艾葉

一兩微炒

右件藥搗細羅為散每於食前溫酒調下二錢

雲母芎藭散

出千金方

治五崩身瘦欬逆煩滿心下痛而生

瘡腰痛不可俯仰陰中腫如有瘡狀毛中痒時痛與藏相通小便不利常拘急頭眩頸項忽急痛手足熱氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上下腹鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下黑多食即下黃多鬱即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒

雲母

芍藥

代赭

東門邊木

燒各一兩

白薑

烏賊骨

白堊

蝟皮

各六銖

驚甲

一作龜甲桂心

伏龍肝

生鯉魚頭

各十

銖八

右治下篩酒服方寸匕日三夜一

鎮宮丸

出濟生方

治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定

或如豆汁或狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久而不止令人黃瘦口乾胃煩不食

代赭

火煨醋淬七次

紫石英

火煨醋淬七次

禹餘糧

煨醋淬七次

香

附子

醋煮各二兩

陽起石

煨紅細研

芎藭

鹿茸

燎去毛醋

蒸 茯苓 去木

阿膠

劉蛤粉炒
成珠子

蒲黃 炒

當歸 去

酒浸各

一兩 血竭

別研各
半兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸梧桐子大

每服七十丸空心用米飲下

治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子

出大全
良方

用乾薑京墨各一兩為末麵糊為丸酒下日五丸

神驗

治崩中漏下青黃赤白使人無子

出本
草

用好墨末一錢匕酒服

又方

出大全良方

以常炙猪腎食之麪裏煮吞之亦佳

伏龍肝散

一名禹餘糧散出三因方

治血氣勞傷衝任脈虛經血非

時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸使人無子

伏龍肝

赤石脂

煨酒淬

牡蠣

煨取粉

烏賊骨

取粉

禹餘糧

煨醋
滓

桂心

各等
分

右為細末空腹酒飲任調下二錢白多者加牡蠣

烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加伏龍

肝桂心隨病加之一方有龍骨一方粥飲服

椒朴丸治婦人血海虛冷臍腹疔痛崩漏赤白男子腎

虛下元久弱

川椒

去目炒出
汗二兩

蒼朮

去皮酒浸
晒乾四兩

乾薑

四兩
切

厚朴

二兩切與
薑同和炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下食前

四生丸治婦人沉痼久冷赤白崩漏臍腹疔痛窘迫後重大便秘澀悶

白附子

乾薑

炮

舶上硫黃

半夏

薑製

各一兩

右為細末酒糊為丸如小豆大每服一十九至十五丸艾湯送下空心日進二服

治崩中漏下青黃赤白使人無子

出聖惠方

桑耳

二兩半

鹿茸

十八銖

右以醋五升漬炙燥漬盡為度治下節服方寸每

日三一方為散每服二錢又或溫酒米飲下空心

又方

出千金方

地榆

知母

右各指大長一尺者㕮咀以醋三升東向竈中

治極濃去滓服之

禹餘糧散

出御藥院方

治血氣血傷衝任虛損崩傷帶漏下

久不斷或下如豆汁或成片如肝或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛面體痿黃心忪悸動發熱多汗四肢困倦飲食減少

禹餘糧

醋滓

伏龍肝

赤石脂

白龍骨

牡蠣

烏魚骨

桂去皮

浮石各等分

右為細末每服三錢煎烏梅湯調下白多加牡蠣龍骨烏賊魚骨亦多加赤石脂禹糧黃多加伏龍

肝桂心隨病加治食前服

小牡丹煎丸治婦人子宮九冷崩漏赤白臍腹疼痛斷

續絕孕

良薑

切麩炒二兩

附子

炮去皮臍

當歸

牡丹皮

熟地黄

各三兩

玄胡

一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服二十九食

前溫服

治崩中漏下色黃赤白使人無子

用燒蜂房末三指撮酒服之大效

治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

用桑木中蟬屎燒灰酒服方寸匕

鼈甲散治婦人崩中下五色不止諸藥無效宜服

鼈甲

二兩塗醋炙微黃

烏賊魚骨

一兩燒灰

龍骨

一兩

雲母

粉 二兩

鯉魚鱗

二兩燒灰

白朮

一兩

肉桂

一兩去皺皮

白

殭蚕

三分微炒

代赭

二兩

伏龍肝

乾薑

一兩炮裂剉

芎藭

二兩

蝟皮

一兩炙微焦黃

白堊

一兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下

二錢

伏龍肝散治氣血勞傷衝任脈虛經血不時忽然崩下
或如豆汁或成血片或五色相雜或赤相兼臍腹冷痛
經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚
悸

伏龍肝

即灶中土也

赤石脂

各一兩

熟乾地黄

酒浸一宿

艾

葉

微炒合二兩

甘草

炙

肉桂

去粗皮各半兩

當歸

去土

乾

薑

炮各三分

芎藭

三兩

麥門冬

去心一兩半

右為粗散每服四錢水一盞半入棗三箇擘破煎七分去滓食前溫服之

牛角鰓散治婦人崩中下五色或赤白不止四肢虛困腹中時痛

牛角鰓

二兩燒灰

龍骨

一兩

當歸

三分剉微炒

乾薑

半兩燒裂

剉

禹餘糧

二兩燒醋淬七遍

熟乾地黄

一兩半

阿膠

二兩搗碎

令黃煙

續斷

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢

騏驎竭散治婦人崩中下血五色惡物去來不斷宜服

騏驎竭

一兩

芎藭

一兩

艾葉

一兩微炒

龍骨

二兩

烏

賊魚骨

二兩燒灰

禹餘糧

二兩燒醋淬七遍

伏龍肝

阿

膠

一兩半搗碎炒令黃燥

熟乾地黄

一兩半

右件藥搗細碎羅為散每服不計時候以粥飲調

下二錢

側柏散治婦人崩中下五色及下血或月水不止

側柏

二兩微炒

黃耆

一兩剉

地榆

一兩剉

赤芍藥

一兩代

赭

一兩

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

牛角鰓

二兩半燒灰

禹

餘糧

二兩燒醋淬七遍

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下一錢

伏龍肝湯治崩中去赤白或如豆汁

伏龍肝

如彈丸七枚

生地黄

四升一方五兩

生薑

五兩

甘草

艾葉

赤石脂

桂心

各二兩

右呖咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

艾葉散治婦人崩中下五色及產後餘疾宜服

艾葉

三分
微炒

丹參

三分

黃耆

一兩
半剉

芎藭

一兩

忍冬

一兩

地榆

一兩
剉

熟乾地黄

一兩
半

右件藥搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

龍骨丸治婦人崩中下五色久不止

龍骨

一兩

烏賊魚骨

三兩
燒灰

白芍藥

半兩

側柏

二兩

微炙 乾薑

半兩
炮裂剉

鹿茸

一兩
去毛塗酥炙微黃

熟乾地黄

一兩

半

右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧
子大每服於食前以粥飲下三十九

治婦人崩中下五色心煩腹痛宜服此方

龍骨

二兩

乾薑

三分炮裂剉

白芍藥

三分

艾葉

一兩微炒

熟乾地黄

烏賊魚骨

一兩燒灰

右件藥搗細羅為散每服不計時候以赤糙米粥

飲調下一錢

禹餘糧丸治崩中赤白不絕困篤方

禹餘糧

五兩

白馬蹄

十兩

龍骨

三兩

鹿茸

二兩

烏賊魚骨

一兩

右為末蜜丸梧子大以酒服三十九日再以知為

度

櫟葉散治婦人崩中下五色或赤白不止

櫟樹葉

三兩

甘草

一兩炙微赤剉

麥門冬

二兩半去心焙

乾薑

一兩炮裂剉

右件藥搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人崩中下五色久不止

牛角鰓

二兩
燒灰

乾薑

半兩
炮裂剉

龍骨

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治婦人崩中五色不止令人黃瘦心煩不食

騏驎竭

一兩

烏藥

半兩

瓷藥

一兩
細剉

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下一錢

又方

茅根 二兩 浮萍草 一兩 刺薊根 二兩

右件藥細剉分為七服每服以水一中盞煎至五分去滓每於食前溫服

治崩中或赤白不問遠年月近

取槐枝燒灰食前酒下方寸匕

治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛

側柏 炒

芍藥

龜甲 炙

桑耳 各六分 乾地

黃

黃耆

續斷

各五分

當歸

炙

艾葉

牛角鰓

煨各四分

禹餘糧

十分

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九丸煎黃耆湯空心一方加代赭研一兩半一方為細散每於食前以溫酒調下三錢名側柏葉散

治傷中崩絕赤

用醞酎杵汁拌酒煎沸空心服一盞

白石脂丸治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方

白石脂

烏賊骨

禹餘糧

牡蠣

各十

八銖赤石脂

乾地黄

乾薑

龍骨

桂心

石韋

白朮

細辛

芍藥

黃蓮

附子

當歸

黃芩

蜀椒

鍾乳

白芷

芍藥

甘草

各半兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每日空心酒下十五

丸日再一方有黃蘗半兩

桑茸續斷散治婦人赤白漏下日月浸久淋瀝不斷亦

治婦人傷中經水過多

一名桑
茸散

桑茸

炙

續斷

熟乾地黄

焙各
二兩

阿膠

炙燥

柏葉

微炙

芎藭

赤石脂

各一
兩半

丹參

一兩

槲

葉

二兩
半

地榆

剉碎
二兩

小薊根

鹿茸

酒浸去
炙毛

牛

角鯢

燒灰各
一兩半

龜甲

醋炙
二兩

當歸

切焙

牡蠣粉

熟艾

炒各一
兩半

右為散每服二錢溫酒調下米飲亦得不拘時

鮫甲散治婦人經血不止五色不定

鮫甲炙

桑耳

各二兩半
金色者炙

當歸

切焙

赤芍藥

半

兩

吳茱萸

湯洗焙乾炒
各一兩半

柏葉

熬

桑寄生

熟乾地黃

焙

烏賊魚骨

去甲

人參

禹餘糧

糧

煨醋淬
二兩

右為散每服二錢米飲調下空心服

芍藥散治婦人經血不止兼五色不定

芍藥

剉炒

龍骨

黃耆

剉

白朮

剉炒各
一兩

乾

薑

炮半
兩

烏賊魚骨

去甲
酥炙

附子

炮裂去
皮臍

桂

去粗
皮

牡

蠟燒研

生乾地黄

焙各三分

右為散每服二錢溫酒調下米飲亦得

地黄湯治婦人經血不止顏色不定

生乾地黄

焙五兩

艾葉

黃芩

去黑口

當歸

切焙各二兩

兩地榆

四兩

伏龍肝

柏葉

生薑

切焙

蒲黃

各三兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服

日二夜一

白芍藥散治婦人漏下五色不止淋瀝連年黃瘦萎痺

白芍藥

一兩

牡蠣

一兩燒為粉

熟乾地黄

一兩半

白芷

三分

乾薑

三分炮裂剉

桂心

一兩

烏賊魚骨

一兩

黃

耆

三分剉

五色龍骨

一兩半

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調二錢

生乾地黄散

出千金方

治漏下去黃方

黃連

大黃

桂心

各半兩

黃芩

蟬蛭

生乾地黄

各六銖

右治下篩空心酒服方寸匕日三

白石脂丸治婦人經血五色雜下或濁白日久不止

白石脂

芎藭

大薊

伏龍肝

各六兩

熟乾地黄

十兩

阿膠

炒令燥
三兩

右為末蜜丸梧子大每服三十九丸米飲下空心晚

食前各一服

乾漆散

出十金方

治漏下黑色

乾漆

炒令
煨盡

大黃

劉炒一作麻黃

細辛

去苗葉

桂

去粗皮
各一兩

甘

草

灸剉
三分

右為散每服二錢粥飲調下溫酒亦得食前服

大黃散

出千金方

治婦人漏下青色

大黃

剉炒
三分

桂

去粗
皮

牡蠣粉

研

黃芩

去黑心
各一分

白

薇

半兩

右為散每服二錢溫酒或米飲調下空心食前服

黃耆湯治婦人漏下赤白淋瀝不斷

黃耆

剉一兩半

阿膠

炙燥
二兩

甘草

剉一兩

大棗

去核五
十顆

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服空心食前

附子丸治婦人經血不止并下五色臍腹痛痞

附子

炮裂去皮臍

硫黃研

乾薑

炮

赤石脂

各一兩

右為末醋煮麪糊丸桐子大每服二十丸至三十丸熱米飲下空心服

龍骨散

出聖惠方

治婦人漏下作五色連年不差

五色龍骨

一兩燒赤

烏賊魚骨

一兩炙黃

白芍藥

五分

乾

薑

半兩炮裂剉

右件藥搗細羅為散每服於食前以赤糙米粥飲

調下二錢

鮑甲散治婦人經血日久不止或赤白或青黑顏色不定

鮑甲

二兩半炙

當歸

切焙二兩

桑耳

二兩半炙全色者為上

人參

狗脊

去毛一兩半

禹餘糧

煨醋率二兩半

白石脂

二兩

莫茱

萸

湯浸炒一兩

赤芍藥

一兩半

厚朴

去粗皮生薑汁剉一兩半

桑寄

生

二兩

桂

去粗皮一兩一分

黃耆

剉二兩

熟乾地黄

焙二兩

右為散每服二錢米飲調下食前日二服

龜甲散

出千金方

治婦人或漏下或赤或白不止氣虛竭方

龜甲

醋炙

牡蠣

燒研各一兩

右為散每服二錢溫酒或米飲調下二錢日三服

治漏下五色亦治嘔血及令人黃瘦虛竭

出聖惠方

用地榆三兩剉醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱

服一合 本草注云地榆主帶下十二白一曰多

赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏
堅六月子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛
九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二
曰五藏不定一方作熱水煎服代茶甚解熱

馬尾散

出聖惠方

治婦人漏下赤白久不止或黑宜服

馬尾

一兩燒為粉

赤茯苓

三兩

牡蠣

燒為粉

鼈甲

一兩半塗

醋炙令黃去裙襴

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

治漏下去赤方

出千金方

白朮

二兩

白薇

半兩

艾葉

二兩半

右治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下五色羸瘦骨節間痛

出後方

用鼈甲燒令黃為末酒調服方寸日三

治女人白崩及痔漏方

出千金方

槐耳

白欬

艾葉

蒲黃

白芷

各二兩

黃耆

人參

續斷

當歸

禹餘糧

橘皮

茯苓

乾地黄

蛭皮

各三兩

牛角鰓

四兩

猪後懸蹄

二十箇

白馬蹄

四兩酒浸

一宿熬

右為末蜜丸每日空心酒下二十九日二加之

白朮散

出聖惠方

治婦人白崩臍腹冷痛四肢不和面無顏

色

白朮

一兩

艾葉

一兩微炒

附子

一兩炮裂去皮

芎藭

三分

阿

膠

一兩搗碎炒令黃燥

桂心

一兩

白石脂

一兩

白礬灰

一兩

烏賊魚骨

一兩燒灰

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

伏龍肝

一兩

當歸

三分剉微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢

治白崩中不絕

出大全良方

牡蠣

禹餘糧

鼈甲

各六分

黃皮

阿

膠

烏賊骨

續斷

白芷

各四分

當

歸

赤石脂

各六分

白石脂

龍骨

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十九空心溫

酒下

當歸散

出聖惠方

治婦人白崩臍腹下疼痛不止

當歸

二兩剉微炙

木香

一兩

桂心

一兩

芎藭

一兩

鹿

角膠

二兩搗碎炒令黃燥

乾薑

一兩炮裂剉

龍骨

一兩

續斷

一兩

附子

一兩炮裂去皮臍

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢

治女人白崩方

出千金方

芎藭

桂心

阿膠

赤石脂

小

薊根

各二兩

地黃

四兩

伏龍肝

如鷄大子七枚

右㕮咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠
令烺盡分三服日三一方無伏龍肝又云有白馬
通汁二升用白石脂

禹餘糧散

出聖惠方

治婦人白崩久不止

禹餘糧

二兩燒醋淬七遍

桂心

三分

芎藭

一兩

當歸

一兩

劉微炒

烏賊魚骨

一兩燒灰

附子

半兩炮裂去皮臍

白礬

二兩令汁

盡

右件藥搗碎羅為散每於食前以熱酒調下二錢

又方

出聖
惠方

附子

一箇炮裂
去皮臍

當歸

一兩剉
微炒

烏賊魚骨

一兩
燒灰

木

賊一兩

牛角鰓

二兩
燒灰

赤石脂

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

牡蠣散

出聖
惠方

治婦人白崩不止面色黃瘦臍下冷疼

牡蠣

一兩燒
為粉

熟乾地黄

一兩

龍骨

一兩

蒲黃

一兩

阿膠

一兩搗碎
炒令黃燥

乾薑

一兩炮
剉

右件藥搗細羅為散每於食前艾葉湯調下二錢

鹿角膠

一兩搗碎炒令黃燥

鹿茸

一兩去毛塗酥炙微黃

烏賊魚骨

一兩燒灰

當歸

一兩剉微炒

龍骨

一兩

白朮

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢

治婦人白崩日夜不絕將欲困篤

出聖惠方

牛角鰓

一兩燒灰

龍骨

一兩

麝香

一錢細研

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治婦人白崩去來不息方

出聖惠方

牡蠣

二兩 搗為粉

熟乾地黄

一兩

乾薑

三分 炮裂剉

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

蝟皮丸

出聖惠方

治婦人勞傷氣血虛損白崩發歇不止

蝟皮

一兩 炙微炒焦

槐耳

三分

白欬

半兩

黃耆

三分 剉

艾

葉

三分 微炒

桂心

半兩

蒲黃

半兩

當歸

半兩 剉微炒

乾薑

三分 炮裂剉

白馬蹄

一兩 燒灰

牛角鰓

一兩 燒灰

續斷

三分

禹

餘糧

二分 燒醋淬七遍

猪懸蹄甲

七枚 燒灰

右件藥搗細為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧子

大母於食前以溫酒調下三十丸

治白崩

出經驗良方

棕櫚

燒灰

絲瓜

俗云魚鱗夏月人家裁作涼棚者是也

右等分為細末空心鹽酒調下

治婦人白崩豆花散

出經驗良方

用白檐豆花焙乾為末炒米煮飲入燒鹽空心服
數次即效紫者勿用

治白崩

出經驗良方

用蚕炒赤煙盡為度研為細末糯米糊為丸或如餅子用酒或陳米湯送下用五月五日蚕炒

馬蹄屑湯

一名白馬蹄散出千金方

治婦人白不絕

白馬蹄

赤石脂

各五兩

禹餘糧

龍骨

牡蠣

各四兩

附子

熟乾地黄

當歸

各三兩

甘草

二兩

白殭蚕

一兩

右㕮咀以水二斗煮取九升分六服日三一方用白石脂下用赤石脂一方為細散每於食前以溫

酒調下二錢

馬蹄丸

出千金方

治白漏不絕

白馬蹄

禹餘糧

各四兩

龍骨

三兩

烏賊骨

白殭蚕

赤石脂

各二兩

右為末蜜丸梧子大酒服十丸不知加至三十丸

內補丹治中調血治婦久患血崩不止累醫無驗宜用此藥立見功效

黃連

山茱萸

乾薑

當歸

鼈

甲

芫花

醋搜令濕

香白芷

乾漆

油搜令濕

川烏

頭

去皮臍已上各一分

巴豆

大者和殼用

亂髮

桃人

已上各半

兩

已上十二味同入一餅子內用鹽泥固濟頂上留

一眼子火煨烟白急將出候冷取藥細研

官桂

一分去粗皮

陳皮

一分剉碎炒

芸臺

一分炒取白仁

白龍骨

一分煨令通赤研細

右四味為細末同前研藥都作一處拌合再研令

勻以煉蜜和丸如梧桐子大每服十九臨卧用溫酒下久患甚者不過兩服

治婦人血崩不止

破綻器碗不拘多少

右件定在硬石上用硬石打碎用紙帛包住再就石上槌極細用生絹兩重篩過為細末每服三錢煮糯米粥飲調勻服三服止一方以糯米糊為丸每服二三十丸米飲下

調經升麻除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食失節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令火乘脾其人必怠惰嗜卧四肢不收困倦乏力無氣短上氣逆急上衝其脈緩而弦急按之洪大皆中指下得之脾上受邪也脾主滋榮週身者也心主血血主脈二者受邪病皆在脈者血之府也脈者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脈主屬心絲心絲者包絡命門之脈至月事因脾胃虛

而心包乘之故漏下月水不調也況脾胃為血氣陰陽
根蒂當除濕去熱益風氣上神以勝其濕又云火鬱則
發之

柴胡

羌活

各錢半

防風

一錢

蔓荊子

七分

獨

活

半錢

蒼朮

一錢半

甘草

炙一錢

升麻

一錢

藁本

一錢

當歸

酒製半錢

黃芪

一錢半

右咬咀如麻豆大勿令作末都作一服以潔淨新
汲水五大盞煎至一盞去滓空心腹中無宿食熱

服之待少時以早飯壓之可一服而已如灸足大
陰脾經中血海穴二七或三七壯立已此藥乃從
權之法用風勝溫為胃下陷而風迫於下以救其
血之暴崩也病血惡之物主後必須黃耆人參當
歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加以活血
藥便是也若經血惡物下之不絕尤宜究其根源
治其本根只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也
若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立已

神仙聚寶丹治血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊血氣攻症疼痛崩中帶下

沒藥

琥珀

各一兩
別研

辰砂

一錢
研細

木香

煨取末
一兩

滴乳

別研
一分

當歸

洗焙取
末一兩

麝香

別研
一錢

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每一丸

溫酒磨下一切難產及產後敗血沖心惡露未盡

益入童子小便如血崩月水前期天暑地熱經水

沸溢宜黃連三錢黃柏黃芩各一錢炒阿膠半錢

再煎作三次溫服又宜四物湯加大艾炒阿膠黃
芩煎又只加炒黑香附子又宜蓮房殼夏蚕蠶烏
藥同燒灰存性為末入鹽五更井水服之又宜雞
蘇丸已上皆是血遇熱則行者又宜白芍藥一兩
乾薑二兩咬咀炒令黃色為細末空心米飲下服
半月見效又宜當歸建中湯加附子乾薑茺藺多
服取效

芳香散治崩不止

香白芷

一兩半

龍骨

一兩

刺芥葉

半兩

右為細末每服二錢溫酒調下米飲湯調亦得食

前

霹靂散治經脈妄行血崩不止

香附子

六兩去毛

川烏頭

炮去尖二兩

石灰

油炒二兩

右為細末每服二錢燒錘淬酒調下食前

艾煎丸治婦人血海虛冷月候過多崩漏帶下腹脇疔痛

艾葉

米醋浸宿炒焦

陳橘皮

去白

高良薑

剉炒

乾薑

炒

赤芍藥

白芍藥

吳茱萸

湯洗七遍焙

蓬莪

朮

煨

龍骨

牡蠣

煨各一兩

右為細末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服五十丸煎艾葉湯下空心食前一方無赤芍藥

三妙散治婦人血崩

平胃散四君子湯各二貼先合煎數服然後喫後

藥

三灰散

敗椶

椶皮

桠木葉

右化灰存性每服二錢酒煎至七分空心服要為丸酒煮糊丸黃丹為衣

四神散

胡椒

四粒

白柏樹根

一兩
嫩者

甘草

半兩

細辛
禾甌

根
一兩

右咬咀每服二錢酒煮三沸通口服大忌鷄鴨子

及一切毒物三方得之周道人親見其醫數人不
可以草藥輕之

荊芥散治血崩年深只一服即效

荊芥根

瓦上焙乾
焦存性

茴香

各等分

右為末每服三錢溫酒調下

玉芝散治血崩

香附子

半生
半熟

代赭石

右為末用酒調下大段崩者煎服一方白湯調下

薔薇根煎療婦人崩中及痢一日一夜數十行

懸釣根

薔薇根

柿根

菝葜

各一
糾

右剉合釜中以水淹使上餘四五寸水煮使三分

減一去滓無大釜稍煮如初法都畢會汁煎取可

丸丸梧桐子大酒服十九日三

當歸散治婦人漏下不止臍腹多痛

當歸

一兩剉
微炒

騏驎竭

二兩

禹餘糧

一兩燒醋
淬七遍

赤

芍藥

一兩

黃蘗

三分微
炙剉

熟乾地黄

一兩
半

地榆

三分

劉

右搗細羅為散每於食前以粥飲調下一錢

治婦人崩中下血不止方

烏梅

二七枚去核微炒

棕櫚

二兩燒灰

乾薑

三分炮裂剉

右搗細羅為散每服粥飲調下二錢

白石脂丸治帶下久虛胞中絕傷月水不斷積日成崩
氣血虛竭肢體黃瘦臍腹急脹心忪頭運不欲飲食

白石脂

龍骨

禹餘糧

火焙醋淬七遍

黃耆

蜜炙

熟乾地黄

燒焙各一兩

香白脂

肉桂

去粗皮川各半兩

芎

當歸

洗焙

附子

炮去皮臍各三分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸溫米飲或溫酒送下食後一名禹餘糧丸

又方

蚕紙灰

一兩

茶籠內箬葉

一兩燒灰

右研細每於食前以溫酒調下二錢

治婦人崩中

用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服煎當
歸酒調下

治女人崩中漏血

以鹿茸炙為末空心溫酒服方寸匕

治婦人漏下絕子

以當歸煮飲之

治婦人崩中血不止

以生地黄搗汁飲之

治赤白漏下

以櫚木剉水煎服

小蘇湯治經候過多遂致崩漏

小蘇根葉

地黃

各取汁一盞

白朮

半兩為末

右用水二盞一處煮取二盞濾去白朮分二服溫服

血崩

烏賊骨

阿膠

炒

右為末調以有節朱筋左轉四十九空心服

久年血崩

麻竹葉煎湯服

血崩肚痛或赤白下

玄胡索

當歸

熟地黄

黃芩

鹽炙

右為末酒下立效白帶加黃耆赤加茯苓

治婦人漏下五色羸瘦者

以鼈甲合訶梨勒皮乾薑三物等分丸空腹三十

丸溫酒送下

又方

又用大薊根生搗絞取汁服半升立定

治崩中淋瀝不止

用大赭石研為細末醋湯調服

代赭一名赤土也

治白炆漏下

用芹菜作羹薤食之煮食亦得

血暴下兼帶

附論

夫婦人臟腑久冷素有赤白帶下復因衝任氣虛不能制約經血致暴下二病兼作故謂經血暴下兼帶下也

方

鹿茸丸治婦人血傷帶下漸成勞疾

鹿茸

去毛
酥炙

白薇

去苗

覆盆子

細辛

去苗

菴

藺子

熟乾地黄

焙

山羊角

蛇床子

炒

白茯苓

去黑皮
各三分

乾薑

炮

遠志

去心

當歸

切焙

芎藭

桂心

去粗皮

續斷

牡丹皮

人

參

卷柏

龍骨

蒲黃

各半
兩

右為末煉蜜和丸桐子大每服三十丸空腹溫酒

下米飲亦得

牡蠣散治帶下兼經水過多暴下片血不限年月遠近

牡蠣

龍骨

肉蓯蓉

酒浸
切焙

赤石脂

石斛

去根

烏賊魚骨

去甲

黃耆

剉各一
兩半

芍藥

炒

阿膠

炒燥

熟乾地黄

焙

牛角腮灰

各二
兩

乾薑

炮裂

當歸

切焙

白朮

人參

桑耳

炙各
一兩

分艾葉炒

芎藭

附子

炮裂去皮
臍各一兩

右為散每服三錢平旦米飲調服日再

澤蘭散

出千金方

治婦人血傷不止兼帶下不斷虛羸困倦

補虛益氣調中止血

澤蘭葉

炙

人參

蜀椒

去目并開口炒
出汗各一兩

厚

朴

去粗皮生
薑汁炙

桂

去粗皮

細辛

去苗葉

魚薹仁

微炒用

藿

本

去苗土

當歸

切焙乾

乾薑

炮

代赭石

山茱

萸

防風

去芦各半兩

柏子仁

炒

芎藭

牡

蠟粉

熟乾地黄

焙

甘草

炙劉

龍骨

各三分

右為散每服二錢溫酒調下米飲亦得一方加白

芷無人參龍骨

鹿茸丸

出千金方

治婦人血傷不止兼赤白帶下不絕面黃

體瘦漸成勞疾及治崩中去赤白

鹿茸

去毛酥炙

白芷

馬頭鬚毛

燒灰

蒲黃

微炒

小薊根

續斷

禹餘糧

煨醋淬各二兩

伏龍肝

熟艾

各一兩

白馬蹄

銹三兩

人參

熟乾地黄

烏賊魚骨

焙 去甲

柏子人

微炒

肉蓯蓉

酒浸 切焙 當

歸

切焙

黃耆

炙剉

白茯苓

去黑皮 各一兩半

右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十丸至三十

丸溫酒或米飲不拘時

黃耆丸治婦人血傷兼帶下臍腹冷痛腰痠疼肢體倦

急煩渴燥

黃耆

剉

熟乾地黄

焙

當歸

切焙

鹿茸

去毛 酥炙

地榆

卷柏

去土

茯神

去木 各一兩半

木香

代赭石

白石脂

艾葉

芎藭

桑寄生

赤石脂

沙參

白龍骨

訶梨勒皮

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧子大每服三十九米飲下

空心日午卧時各一

茯苓散

出大全良方

治婦人血傷兼帶下積久不止面黃體

瘦漸成虛勞腰脚沉重胎氣多損

白茯苓

去黑皮

木香

杜仲

去粗皮炙

菖蒲

熟

乾地黄

焙

柏子人

研

秦艽

去苗土

訶梨勒皮

菟絲子

酒浸別搗

青橘皮

去白焙

赤石脂

五加皮

牛角鰓灰

烏賊魚骨

去甲

艾葉

切焙各一兩

右為散每服二錢溫酒調下糯米飲亦得或有臆

息用鯉魚糯米粥下藥

牡丹皮湯

出十金方

治婦人血傷不止兼五色帶下

牡丹皮

熟乾地黄

焙

槲葉脉

剉炒

艾葉

微炒各一兩半

禹餘糧

煨赤醋淬七遍

芎藭

龍骨

各一兩

柏

葉

炙

芍藥

剉炒

厚朴

去粗皮土薑汁炙

白芷

伏

龍肝

青竹茹

地榆

剉各一兩

阿膠

炙令燥半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心

日午卧時服相去如人行十里久再服

牛角地黄散治婦人血傷不止兼帶下赤白腰背痛虛

乏困倦

方見崩中漏下數

熟布湯

一方熟乾地黃散聖惠方

治婦人血傷無赤白帶下日夜不

止悶絕頭目昏重

熟布皮

刀刮取一把

蟹爪

剉二令

甘草

炙剉

白茯苓

去黑

皮

熟乾地黄

焙

桂

去粗皮

阿膠

炙令燥

芍藥

剉炒

當歸

剉炒

伏龍肝

各一兩

淡竹茹

一把

蒲黃

輕炒二兩

拘時

右粗搗篩每服三錢水一盞半煎一盞去滓服不

人參散治婦人血傷兼赤白帶下日久不止羸困

人參

五味子

地榆

艾葉

燒灰

牡

蠣

煨

白茯苓

去黑皮

熟乾地黄

焙

龍骨

煨

續斷

芎藭

甘草

炙剉各一兩

右為散每服二錢溫酒調下水一盞煎至七分溫服亦得空心日午卧時各一

茯神丸治婦人血傷兼帶下日久不止頭旋目眩心煩身熱腰脚疾重肢體瘦瘁

茯神

去木

當歸

切焙

白芷

桑耳

炙

芎

藭

赤石脂

卷柏

去土

乾薑

炮各一兩

牡蠣

粉

地榆

白龍骨

一兩半

右為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十丸溫酒或
米飲下空心日午臨卧各一服

陽起石湯治婦人血海冷敗脫血帶下諸虛冷疾

陽起石

二兩
別搗

白茯苓

去黑皮

人參

甘草

炙剉

赤石脂

龍骨

各三兩

伏龍肝

五兩

生地黄

細切

焙一
升

附子

炮裂去皮
臍一兩

續斷

三兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服早
晨日午晚後各一

紫金散

出大全良方

治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不

斷腰腹重痛凡是五色帶疾並之

禹餘糧

煨赤礬醋中淬如此者七次細研水飛挹乾秤三兩

赤石脂

煨

龍骨

煨石龍各一兩

白芍藥

川芎

附子

熟地黃

當歸

各一兩

乾薑

炮

肉桂

各半兩

右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空心食前一日二服一方有甘草

小薊根湯治婦人月經過多或卒暴血傷不止或色如

肝或成片者

小薊根

三兩

當歸

微炙

阿膠

炙令燥

芎藭

青

竹茹

續斷

地榆根

各一兩半

伏龍肝

二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

日三

龍骨飲治婦人經血暴下不止

龍骨

三兩

青竹茹

二兩

乾薑

炮二兩

伏龍肝

五兩

槲葉

十枚炙

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時

治婦人傷中血不止兼赤白帶下

芍藥

炒一兩

乾薑

炒三分

牛角鰓

醋炙焦半兩

右為散研勻每服二錢米飲調下

治經血暴下兼帶下

蒲黃

二兩

鬱金

熟乾地黄

焙各三兩

右為散每服三錢空心米飲調下

牛角鰓丸治婦人經血暴傷兼帶下久不止

牛角鰓灰

赤石脂

各一兩半

白龍

三兩

艾葉

一分

桑耳

炙

鹿茸

去毛酥炙

阿膠

炙燥

乾薑

炮各一兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心食前煎黃耆湯或溫酒下

牛角鰓散治婦人血傷兼赤白帶下

黃牛角鰓

酒炙

側柏葉

艾葉

炒

當歸

切焙

續斷

炒

地榆

炒

赤石脂

研

伏龍肝

各一兩

右為散每服三錢食前米飲或溫酒調下

菟絲丸治婦人血傷兼赤白帶下

菟絲子

酒浸一宿別搗

龍骨

牡蠣

炒

艾葉

炒

赤石脂

烏賊魚骨

燒

藁香子

微炒

附子

炮裂去皮
臍各一兩

右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十九
至三十九丸空心食前醋湯下

慮營丸治傷中赤白帶下

慮會

半兩

赤石脂

樗皮

生薑汁炙

地榆

劉各一兩

牛

角鰓

各三分

禹餘糧

醋淬

阿膠

炙燥各半兩

側柏

一兩一分

右為末研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九陳

米飲下

龍骨散治婦人經血暴下兼赤白帶下不止

龍骨

一兩

烏賊魚骨

去甲

鹿茸

去毛

續斷

芍藥

劉炒

赤石脂

肉蓯蓉

酒浸切焙各三兩

乾地

黃

炒一兩半

右為散每服二錢空腹米飲調下日再

柏葉散治傷下血下兼帶或白或赤臍下疔痛

側柏葉

芍藥

艾

各三分

熟乾地黄

焙

禹餘糧

醋淬

騏驎竭

各一兩

當歸

剉焙

牛角鰓

各炙

三分

右為細末研勻每服二錢生薑米飲調下

川芎散治婦人崩漏帶下諸方不效者

川芎

當歸

生地黃

伏龍肝

龍骨

芍藥

蒲黃

各一兩

御米殼

去蒂蜜浴炒焦

四兩

右為細末每服二錢溫酒或米飲調下食前

地榆湯治婦人經血崩下兼帶下積久不差面目萎黃困倦羸瘦

地榆

當歸

切焙

阿膠

炙燥

黃耆

剉各一兩半

艾

葉

三分

龍骨

碎二兩

右㕮咀如麻豆大每服三錢水一盞薑三片煎至

七分去滓食前溫服

寄生湯治婦人經血暴傷及帶下經久不止

桑寄生

雞蘇

淡竹茹

各一兩

芍藥

地榆

各一兩半

白龍骨

二兩

右㕮咀如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服一方用附子三分無淡竹茹

黃耆丸治婦人血傷兼帶下不止

黃耆

剉

芍藥

各二兩

赤石脂

四兩

當歸

切焙

附

子炮裂去
皮臍熟乾地黄焙各
二兩

右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下
一方有乾薑無地黄

血崩帶下

用膠艾湯以海螵蛸炙黃刮碎和入同煎蠶退紙

丸并澤蘭丸

杉節散出聖
惠方治血傷兼帶下不止

杉木節燒灰
存性楮皮紙燒灰各等分
一方作蠶紙

右研令勻細每服二錢米飲調下

黃芩湯治婦人經血暴下兼帶下赤白不止

黃芩

去黑心

當歸

切焙

柏葉

焙

蒲黃

微炒各半兩

艾

葉

炒一分

生乾地黄

焙二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

日三

龍骨丸治婦人傷中血不止兼赤白帶下

龍骨

三分

烏賊魚骨

炙二分

芍藥

三分

鹿茸

酒炙三分

熟乾地黄

焙分

側柏葉

三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九乾薑

米飲下

地龍散治婦人衝任氣虛經血暴下兼帶下

地龍

炒

鬱金

棕櫚

燒令存性

柏葉

地黄

汁

胎髮

泥裹燒過去泥

右各等分搗羅為散每服三錢溫地黄汁酒調下

不拘時

地黄湯治婦人血傷帶下

地黄

剉炒當歸切焙

黃耆

剉

阿膠

炙令燥各一兩

艾

葉

炒焙三分

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服日三

車前湯治經血暴下兼帶下

車前子

淡竹葉

黃芩

去黑心

阿膠

炙燥杵碎

生地黃

各一兩

右將四味㕮咀以水二盞煎至一盞下膠攪烱頓服

阿膠散治婦人血傷兼帶下不止

阿膠

炙燥

柏葉

焙乾

當歸

去芦頭焙

龍齒

別搗細研各半兩

禹餘糧

醋研一兩

右為細散每服二錢用米飲調下早晨午時各一服

立效散

出經驗良方

治血崩及赤白帶下

晚蚕沙

醋浸一宿
焙乾秤

當歸

酒浸
焙乾

女子頭髮

焙焦

烏龍

尾

生薑自然汁浸炒乾
各一兩即久塵灰

舊棕葉

燒存性
二兩

右為細末每服二錢熱酒調下

芍藥酒浸方治婦人血傷兼赤白帶下

芍藥

黃耆

生地黃

各三兩

艾葉

一兩

右四味咬咀如麻豆大以絹袋盛浸酒一斗經宿
後每食前隨量溫飲之

蒲黃丸治婦人血傷赤白帶下不止

蒲黃

龍骨

各三兩

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前黃耆湯下

地黃益母草湯治婦人血傷不止兼赤白帶下

生地黃汁

益母草汁

各半碗

右半取半盞同煎至七分日三五服

五倍子散治血崩帶下

大艾

一兩醋煮

五倍子

二兩炒赤

烏梅

半兩去核

川芎

半兩

右為末每服二錢空心米飲下兩服止

治血下帶下

香附子

杵去皮二分童子尿浸一日夜

艾葉

三分米醋煮透曬乾

右為末米糊丸梧桐子大每服五六十丸艾醋湯或醋湯一方為末調服

治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

以野猪外腎和皮燒灰細研羅過為末米飲下

治帶中帶下腸風下血兼赤白痢

用棕櫚燒灰存性為末湯破酒浸令淡調下三錢
空心服

治下閉血瘀女子帶下下血及婦人崩中

用炒牛角鯁並燒灰酒服一方為末酒調服

金不換散治婦人血海暴崩淋瀝不止

朱砂

二錢

當歸

飛羅麩

烏龍尾

竈屋
上垂

塵是也
各半兩

右為細末每服二錢燒秤鎚通紅投酒中用此酒

調下食前

一婦人經候黑血凝結成塊左廂有血瘀水泄不止穀
有時不化有時化後血塊暴下併水俱作是前後二陰
有形血脫竭於下既久經候猶下調水泄日見三兩竹
食罷煩心不快飲食減少甚至瘦弱求治乃審而思之
曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必
先歲氣無伐天和無盛盛無虛虛遺人天殃無致邪無
失正絕人長命故仲景云陽盛陰虛下之則愈汗之則

死大抵聖人立法且如升陽或發散之劑足助春夏之陽氣令其上升乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣此病是此也當用此法治之升降浮沉之至理也天地之氣以升降浮沉乃從四時如治病不可逆之故經云順天者昌逆天者亡可不畏哉夫人之升降亦有四時天地之氣不可認止在外人亦體同天地也今經漏不止是前陰之氣血已脫下矣水泄又數年是後陰之氣血下陷已脫矣後陰者至有形之物也前陰者精氣之戶下竭

是病人用身之氣血常行秋冬之令陰主殺此等收藏之病是也陽生陰長春是也在人之身冷氣升浮者穀氣上行是也既病人周身氣血皆不生長穀氣又不升其肌內消少是兩儀之氣俱將絕既下元二陰俱脫血氣消竭假令當是熱證今下焦久脫此為寒矣此病久沉久降寒濕大勝當急救之瀉寒以熱除濕以燥大升大舉以助升長補養氣血不致偏竭聖人立治法濕氣大勝以所勝治之助甲風木上升是也故經云風勝濕

是以所勝平之也當先調和胃氣次用白朮之類以燥其濕是以專滋元氣如其不止後用風藥以勝濕此便是大舉大升以助春夏二濕之久陷下之治也

益胃升陽湯血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉也皆以為補氣殊不知甘能生血生此陽生陰長之理故先理胃氣人之身內穀為寶

黃耆

二錢

人參

一錢半有
救去之

炙甘草

一分

升麻

半錢

柴胡

半錢

白朮

三錢

當歸身

一錢
酒浸

炒麴

一錢
半

陳

皮一錢

生黃芩

瀉盛暑之伏瘕金肺逆每服中加少許秋涼去之

右咬咀每一服秤一錢或二錢視食加減之如食

少已定二錢內更減之不可令勝食每服水二大


盞煎至一盞去滓稍熱服如腹中痛每服加芍藥

三分去皮中桂少許如渴或口乾加乾葛二分不

計時候

治暴下血

以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏可丸
即丸梧子大以米飲下五六十丸無不愈者



普濟方卷三百三十

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百三十一

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣李大任

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十一

明周王朱橚撰

婦人諸疾門

赤白帶下

附論

夫帶下有三十六種色雖不同所致則一皆由勞傷過度損動經血致令體虛受於風冷風冷入於胞絡搏其血之所成也衝脈任脈為經脈之海衝任之為病女人則帶下而手太陽為小腸之經也手少陰心經也心為

臟主於裏小腸為腑主於表此二經之血在於婦人上為乳汁下為月水衝任之所統也衝任之脈既起於胞內陰陽過度則傷胞絡故風邪乘虛而入於胞損衝任之經傷太陽少陰之血致令胞絡之間穢液與血相兼帶而下冷則多白熱則多赤冷熱并則赤白雜下間有五色者是五藏俱虛各隨其色而應也病者起於風氣寒熱之所傷或產後早起不避風邪風邪之氣入於胞門或中經脈流傳臟腑而發下血名為帶下若傷足

厥陰肝之經其色則青如泥色若傷手少陰心之經其色赤如紅津若傷手太陰肺之經其色則白形如涕若傷足太陰脾之經則其色黃如爛瓜若傷足少陰腎之經則其色黑如血此為其同也問曰風邪氣之所中是人皆受之何為婦人獨有此病答曰五臟六腑男女雖同其中細微各有差別緣婦人有胞門子臟風冷中之則為所病若男子則為它病矣又問何以名為帶下復有冷熱者何答曰脈有數經名字不同寄經入脈有帶

在腰如帶之狀其病在於帶脈之下其有冷熱者即隨其性也 婦人平居之時血欲常多氣欲少方謂主氣有厚百疾不生儻或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶氣平少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交併則赤白俱下有室女或室後虛損而有此疾者皆令孕育不成以致絕嗣凡有是病證速宜治之久而不治令人面色黧黯肌肉瘦瘠腹脇脹滿攻刺疼痛甚至足脛枯細多苦逆冷尪羸不能食矣診其脈右手尺脈浮

為陽陽絕者無子若足冷帶下也 凡婦人赤白帶下
或出白物如脂可服導水丸禹功散或單用無憂散量
虛實加減泄訖服桂苓散五苓散葶木香散同治濕
法或用獨聖散止漏亦可室女白帶下可用茶調散吐
之吐訖可服導水丸禹功散瀉之次服葶薤木香散四
物湯白朮散之類則愈矣治白者同瀉濕法則是也
婦人有濁污水不止亦同此法也

方

沉香牡丹丸治婦人血海久虛經候不利赤白帶下血氣衝心多發刺痛四肢困煩

沉香

三分

牡丹皮

去心

赤芍藥

當歸

桂心

川芎

黃耆

去蘆蜜炙

人參

茯苓

山藥

白芷

橘紅

吳茱

萸

炮七次炒

白巴戟

去心

木香

牛膝

酒浸去苗

枳殼

去穰麴炒

肉豆蔻

製厚朴

生乾薑

白

龍骨

各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下若心腹痛煎白芷酒下

治女人帶下諸方

大黃

蒸三斗米下

附子

茯苓

牡丹

桔

梗

亭歷

各三兩

厚朴

人參

當歸

蝨蟲

蜀椒

吳茱萸

柴胡

乾

薑

桂心

各半兩

細辛

二兩半

右為末蜜和丸如梧桐子大每服空心酒服二九

不知加之以腹中溫溫為度一本有麻子三兩澤

蘭半兩無蜀椒葶藶

黃耆丸

出聖惠方

治婦人腹臍冷熱相攻心腹刺絞疔痛腰

間時痛赤白帶下面色萎黃四肢羸乏

黃耆

一兩半剉

龍骨

一兩

當歸

一兩剉微炒

桑寄生

一兩

鹿茸

二兩去毛塗酥炙令黃

地榆

一兩剉

乾薑

三分炮裂剉

木香

一兩

代赭

一兩

白石脂

一兩

赤石脂

一兩

人參

一兩去蘆頭

艾葉

一兩微炒

芎藭

一兩

卷柏

一兩半微炒

訶梨

勒皮 一兩 熟乾地黄 一兩半

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐

子大每於食前以煖酒下三十丸

竹茹丸 出大全良方 治婦人崩中赤白帶下

當歸 白朮 青木香 蚕蛻 煨 墨

棕刷 煨 川山甲 煨各一兩 地榆 竹茹 川

芎 白茯苓 粉草 血餘 煨 牡

蠣 煨 綿子 煨各半兩 熟地黄 四兩 赤石脂 煨三兩

右煨藥用綿子裏定入瓶子內用鹽泥固濟用炭火再煨存性却同前藥碾為細末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸空心酒調下

卷柏丸

出濟生方

治婦人室女腹臟冷熱相攻心腹絞痛腰

痛腿痛赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

黃耆

去頭蜜炙

熟地黃

洗各一兩半

卷柏

醋炙

赤石脂

煨醋淬七遍

鹿茸

醋炙

白石脂

芎藭

代赭

石煨醋淬七次

艾葉

醋炒

桑寄生

鼈甲

醋炙

當

歸

去蘆頭酒洗微炒

地榆

各一兩

木香

不見火

龍骨

各半兩

乾

薑

炮三分

右為末醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心食前用米飲送下

治婦人及女子赤白帶方

出千金方

禹餘糧

當歸

芎藭

各一兩半

赤石脂

石白脂

阿膠

龍骨

石韋

一兩六銖烏

賊骨

黃蘗

白斂

黃芩

一方黃連

續斷

桑耳

牡蠣

各一兩

右為末蜜丸如梧子大空心米飲下十五丸日再

加至三十丸為度

白馬蹄丸

出千金方

治女人下焦寒冷成帶下赤白濁

白馬蹄

鼈甲

鯉魚甲

龜甲

蜀椒

各一兩

磁石

甘草

杜仲

萆薢

當歸

續斷

芎藭

禹餘糧

桑

耳

附子

各二兩

右為末蜜丸梧子大酒服十丸加至三十丸日三

服

桂心飲治月經不調變為帶下

桂

去粗皮

芍藥

各一斤

蟲

去翅足炒

水蛭

微炒

消石

土瓜根

麩麈

微炒

大豆

續斷

牡

丹

去心

當歸

各半兩

野狐肝

焙乾一分

桃仁

去皮尖雙仁炒一百粒

粒

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食前

溫服日三

海蛤丸

出宣明論

治婦人小腹濁敗赤白帶下五淋臍腹疼

痛寒熱口乾舌燥不思飲食

海蛤

半夏

芫花

醋炙

紅娘子

去翅訶

子炒

川練子

麩裏煨去皮

玄胡索

茴香

一兩炒

乳香

三錢

辰砂

半兩

朱砂

半入藥半為衣

沒藥

各一兩

當

歸

一兩半

右為末醋糊為丸如小豆大每服五丸至七丸醋

湯下量病人虛實加減

小牛角鰓散

出千金方

治帶下五賁一曰熱病下血二曰寒

熱下血三曰經脈未斷為房事則血漏四曰經來舉重傷任脈下血五曰產後臍開經利五賁之病外實內虛方

牛角鰓

一枚燒令赤

鹿茸

禹餘糧

當歸

乾薑

續斷

各二兩

阿膠

三兩

烏賊骨

龍

骨

各一兩

赤小豆

右治下竹師空心以酒服方寸匕日三一方無鹿茸

烏賊骨

桑寄生散

一名龜甲散
出聖惠方

治婦人赤白帶下久不止腰腿

面黃體瘦四肢少力

桑寄生

桑耳 炙

當歸

剉炙各一兩

白芍藥

芍藥 各二分

烏賊魚骨 燒灰

柏葉

炙各一兩

龜甲

醋炙一兩

半

禹餘糧

煨醋淬七遍二兩

吳茱萸

湯洗焙炒半兩

右搗研為散每服二錢食前溫酒調下

金不換丸治婦人子宮虛憊或服冷藥過多致令赤白帶下淋瀝不止或產後用力過多陰門突出不收一應不正之疾並宜服之

當歸

半兩

熟地黄

一兩

川白芷

半兩

五倍子

一兩

白石脂

煨六兩

禹餘糧

半兩煨七次用醋浸

赤石脂

煨二錢

龍

骨

煨六錢

熟艾

一兩

附子

七錢

右為細末醋糊丸二十九丸用艾葉煎酒米飲亦得

虛加附子一箇

艾煎丸

出百一選方

治婦人一切虛寒胎前產後赤白帶下

或成血瘕久服此藥自然融化

伏道艾

揉去塵土擇淨枝梗取葉秤五兩先用大肥淮棗一十二兩砂瓶內水煮爛去

核同艾葉一處搗爛如泥捻成薄餅子猛火焙乾乘熱急碾為末

大漢椒

去目枝梗

并合口者取淨秤五兩以阿膠二兩米醋三升用椒於砂瓶內煮極乾取出焙燥碾細末

當歸

去酒浸洗及須

白芍藥

真白者

川芎

白薇

附子

大者炮去皮臍

卷柏

取青葉

澤蘭

去枝梗取葉已上各焙乾秤用熟

乾地黄

如鋪上賣者須淨洗漉去浮者晒乾酒浸蒸晒再入酒浸蒸五七次如鋪饒煎

香美方可用

亦焙乾料

右同為細末與前艾葉椒末秤勻米醋丸如梧桐
子大每服五七十丸至百丸二百丸艾醋湯空心
食前服此藥一婦人因產後虛寒嘔惡不食腹痛
如割時作寒熱後出盜汗瘦悴骨立臍腹之左結
成硬塊其大如掌冰冷雖盛暑此虛處獨無汗每
塊微動則痛不忍百藥治不效夢中忽有人授以
此方因服之惡心寒熱盜汗輒止盡一料遂平復

獨血塊如故服至五六料其塊自融化而出如魚凍

萬靈丸治婦人諸虛痼冷腰腹困疼赤白帶下一切虛冷

當歸

焙

川芎

熟地黄

焙

茯苓

乾

薑炮

桂

白朮

芍藥

甘草

附子

各等分

右為細末練蜜為丸如彈子大每服一丸熱酒化

下或作小丸如梧桐子大溫酒米飲下空心食前

日進二服

桑耳散

出聖惠方

治婦人赤白帶下

桑耳

一兩
微炒

白芍藥

三分

黃耆

三分
剉

肉苳蔻

一兩
去殼

阿膠

一兩搗碎
炒令黃燥

熟乾地黃

一兩

當歸

一兩剉
微炒

蒲

黃

半兩

桔梗

一兩去
蘆頭

右件藥搗細羅為散每服食前以粥飲調下二錢

芎藭湯

一名溫中
芎藭湯

治帶下漏血不止及風虛冷熱勞損

衝任月水不調崩中暴下腰重衰急淋瀝不斷及產後失血過多虛羸復痛或妊娠胎動不安下血連日小便頻數肢體煩倦頭暈目暗不欲飲食

芍藥

乾地黄

黃耆

芍藥

吳

茱萸

甘草

各二兩

當歸

乾薑

各三兩

右咬咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因

有赤白不止者除地黄吳茱萸加杜仲人參各二

兩

出千金方

桑耳湯治婦人帶下赤白是虛損因風得之或房室無忌得之

桑耳

微炒三分

芍藥

黃耆

剉

熟地黄

焙

阿

膠

炙燥各一兩

地黄

煨醋淬五遍燒赤

蒲黃

微炒

白堊

燒赤各一

兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞半入豉半合煎至八分去滓食前溫服日三

治帶下有病無子服藥十四日下血二十日下長蟲及青

黃汁出三十日病除五十日肥方

出千金方

大黃

破如豆粒煮令黑色

柴胡

朴硝

各一斤

芎藭

五兩

乾薑

蜀椒

各一斤

茯苓

如鷄子大一枚

右為細末蜜丸梧桐子大先食米飲服七丸不知加至十丸以知為度

龍骨散治婦人帶下

龍骨

乾薑

炮各一兩

當歸

焙

禹餘糧

煨醋淬五七遍

阿膠

炙燥

續斷

各二兩

牛角腮

炙焦三兩

右為散每服三錢食前溫酒調下日三

柏葉散治婦人帶下腹痛

柏葉

炙黃二兩

芍藥

芍藥

白芷

乾薑

炮

牡丹

去心各二兩

當歸

焙半兩

右為散每服二錢食前溫酒調下

乾柿煎丸治婦人衝任久虛下血不時及赤白帶下連
年不止盜汗咳嗽肢節痠疼血海虛冷臍腹刺痛不進
飲食日漸瘦弱

乾柿

十枚去蓋細切

沉香

剉一兩杵末好酒三升同乾柿浸半日文武火熬成膏研

細入諸藥

禹餘糧

四兩紫色者燒赤醋淬十度研細

吳茱萸

湯浸一宿去浮

者慢火炒

白朮

陳橘皮

去白焙

烏頭

酒浸一宿炮裂去皮臍各

一兩乾薑

炮半兩

地龍

去土二兩瓦上慢火炒

右搗研七味為末入前膏和搗一二千杵丸如梧
桐子大每服二十丸至三十丸溫酒或醋湯下

麒麟竭湯

出聖惠方

治婦人血傷赤白帶下小腹疼痛

麒麟竭

地榆

黃蘗

去粗皮炙各一兩

禹餘糧

煨赤醋
滓五遍

赤芍藥

剉炒各
一兩半

熟乾地黄

切焙四兩一
作生乾地黄

右粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不
拘時候一方為細散食前粥飲調下二錢

白欬丸

出十
金方

治室女衝任虛寒帶下純白及治漏下去

白

鹿茸

醋蒸焙
二兩

白欬

金毛狗脊

燎去毛
各一兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸如梧桐子
大每服五十丸空心溫酒下一方為末空心米飲

服方寸匕日三

土瓜根散

出全陽方

治帶下經水不利少腹滿痛經一月再

見者

土瓜根

芍藥

桂枝

蟬虫

各三分

右杵為散酒服方寸匕日三服

阿膠散治婦人血崩不止赤白帶下

阿膠

炒燥

白龍骨

赤石脂

乾薑

炮各半兩

右為細末每服二錢熱酒調下崩漏艾湯下

茅花散治血崩不止赤白帶下

茅花

一握炒

棕樹皮

三寸

嫩荷葉

三張

甘草節

二兩

右為細末空心酒調一匙尖服

棕毛散治赤白帶下血崩漏胎氣久冷臍腹疼痛

棕毛

燒灰存性

蒲黃

炒各等分

右每服三錢好酒調下空心食前日進二服

香附子散治赤白帶下

百草霜

一兩

當歸

香附子

柴金皮

烏藥

各八錢

伏龍肝

一兩

右為末以水牛膏同茴香炒舊酒調三大錢不拘時候通口服忌食魚腥母猪等肉

治產後赤白下腹絞痛不可忍方

黃連

四兩

黃蘗

三兩

阿膠

炙

蒲黃

各一兩

當歸

六分

黃芩

二兩

右搗蜜為丸如梧桐子大米飲下六十九日二夜一服立定

艾葉丸治婦人小宮久冷赤白帶下

艾葉

一斤

蒼朮

香附子

吳茱萸

橘皮

各四兩

右用米醋五升慢火煮至醋乾為度晒乾為細末
醋糊為丸如梧子大每服七十丸淡醋湯送下空
心食前服

桑寄生湯治婦人帶下三十六種不同

桑寄生

炙

芎藭

艾葉

炙各一兩

當歸

焙一兩

白

膠

炙燥
半兩

右粗搗篩每服三錢水半盞酒半盞同煎至七分
去滓食前溫服日三若服此湯口乾渴者加茅根
切二合生地黃一兩麥門冬去心一兩

治婦人一切赤白帶下臍腹疼痛

乾薑

二兩
炮

艾

三兩糯米湯
粥和過燒乾

神麴

三兩
炒

吳茱萸

一兩

半當歸

一兩
半炒

右為末醋打前艾葉末糊為丸如梧子大每服二

十丸至三十丸食前溫酒送下

白芷丸治婦人帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿

白芷

一兩

單葉紅蜀葵根

二兩即單谷古梅根無敗以蘇木節代之

亦可白芍藥

白礬

燒枯別研各半兩

右為末蠟丸如桐子大空腹米飲下十丸或十五丸候膿盡仍以他藥補之

白馬駢散治帶下方下白者取白馬駢下赤者取赤馬駢隨色之

白馬駢

二兩

龜甲

四兩

鼈甲

十八銖

牡蠣

一兩十銖

右為治下節空心酒下方寸匕日三服加至一方寸半一方白馬蹄

衛生湯

白芍藥

當歸

各二兩

黃耆

三兩

甘草

一兩

右為粗末每服半兩水二盞煎至一盞空心如虛者

加人參一兩月事不來先服降心火之劑後服局
方五補丸後以衛生湯治脾養血氣可也

沒藥散治婦人血氣不調赤白帶下腰痛冷男子膀胱
小腸氣痛疝氣沉墜痛悶

香附子

炒四兩

乾薑

一兩半炮

白芍藥

五靈脂

各二

炒兩

右為細末每服二錢熱酒調下心疼醋調下食前
日進二服

治婦人子宮久冷赤白帶下

白礬

一兩

硫黃

一兩

黃丹

半兩

硃砂

半錢

右為細新磁碗內先鋪硫黃次鋪白礬上用黃丹蓋之文武火燒令白色為度再與麝香半錢同研極細每服半兩新綿子裏如彈子大水蘸過於陰門內深處令過三日俟藥力盡惡物纏白自落三次病愈醋糊作丸

牛角鰓散治婦人血氣不和赤白帶下

牛角鯢

三兩燒灰

桂心

半兩

當歸

二兩酒浸

牛膝

半兩去苗

右件藥搗細羅為散每於食前以溫水調下二錢

煮附子丸專治婦人子宮久冷赤白帶下

香附子

去毛一斤

當歸

二兩酒浸

艾葉

一兩

人參

一兩

木

香

一兩

右用銀石磁罐一箇可容五升者入艾葉香附子

於內將好醋用慢火煮至一伏時候微乾搗為餅

用藥碾乾碾為細末煮藥米醋糊為丸如梧桐子

大每服五十丸至七八十丸淡湯送下空心食前

服之

白芷散

出大金良方

治婦人赤白帶下

白芷

一兩

海螵蛸

二兩燒

胎髮

一團煨

右為細末空心溫酒調下二錢

白礬丸

出聖惠方

治婦人血臟久冷赤白帶下補虛退冷煖

血海

白礬

四兩

大附子

二箇二兩

黃狗頭骨

灰四兩

右為末米粟粥為丸如梧桐子大每服三十九醋

湯吞下或米飲亦可空心日三服忌生冷毒物

苦練

出保命集

治婦人帶病熱入小腸為赤冷入大腸為白

皆任脈經虛也

苦練

淬酒浸

茴香

炒

當歸

各五分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空

心溫酒送下赤者入小腸白者入大腸其本濕

熱冤結子脈不散故為赤白帶下也冤屈也結帶

也屈帶而病熱不散先以十棗湯下之後服苦練
丸大玄胡散調下之熱去濕除病自愈也素問云
腰腿疼痛四物四兩加羌活防風各一兩

天先丸

出楊氏
家藏方

治婦人一切虛冷赤白帶下小便膏淋

變成虛損

附子

一枚及七錢
者炮去皮臍

川烏頭

炮去皮
臍尖

海帶

去土

海藻

去土

茴香

微炒

葫蘆巴

天仙子

湯浸
微炒

硫黃

別研

乾薑

炮各
一兩

右用為細末用獐猪肚一枚去脂淨洗入藥在內
用酒醋水共一升慢火煮猪肚軟爛取出細切入
鉄臼內搗為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫
醋湯下忌甘草

龍骨散

出大全良方

治婦人赤白帶下或因經候不斷者

右以龍骨燒灰為細末空心煎艾葉湯調下二錢
補骨脂煎治婦人帶下并脚弱

補骨脂

炙

安息香

研各一兩

胡桃仁

二兩

右搗研極細煉蜜為調稀餬每服半匙空心溫酒調下

火龍丹治婦人赤白帶下腹肚疼痛及冷痛

蛇床子

二兩
微炒

枯白礬

二兩

韶粉

三錢

右為末醋糊丸如彈子大乾胭脂為衣綿裹納於玉爐內坐不多時覺下微疼勿疑其病都取綿子上如爛粉每日一丸煖肚止冷疼

綠礬丸

出聖
惠方

治婦人赤白帶下連年不瘥

綠礬

一兩
燒赤

金底墨

一兩

烏賊魚骨

一兩
炙黃

右件藥同研為末以粟米飯和丸如梧桐子大每

服食前以煖酒下十五丸

又方

出聖
惠方

白芍藥

一兩

艾葉

一兩
微炒

乾薑

一兩
炮裂

右件藥搗細羅為末以軟飴和丸如梧桐子大每
於食前以粥飲下三十丸

治帶下方

出千
金方

枸杞根 一斤 生地黃 五斤

右㕮咀以酒一斗煮取五升分為三服水煮亦得

破故紙散

出大全良方

治赤白帶下

破故紙

石菖蒲

等分並劉炒

右為末每服二錢用菖蒲浸酒調服更入斑蝥五分去翅頭足糯米同炒黃去米

治赤白帶下

出經驗良方

石菖蒲

檀子

等分為末

右鹽酒溫調下

治婦人赤白帶下及尿水不止如崩之狀

出經驗良方

芍藥

炒令紫色以紙盛地上出火毒

黃狗頭骨

各二兩燒存性

右為末每服二錢溫酒下

如聖丹

一名火龍丹出神效方

治婦人經脈不調赤白帶下

枯白礬

四兩

蛇床子

二兩

右為細末醋糊為丸彈子大乾胭脂為末衣綿裏入陰門用熱極再換

治婦人赤白帶下

龍骨

半兩 船上硫黃 三錢

右為末每服半錢無灰舊酒調空心服一日二服
不問年月遠近盡令金效

神功丹治婦人赤白帶下如神

枯白礬

五錢

烏頭

一分 炒黃

右為細末蜜丸如彈子大綿包之臨卧時陰門內
納之

治婦人赤白帶下連年不瘥

出聖惠方

牛角鯁

二兩燒灰

馬片子

一兩

右件藥搗細羅為散每于食前以溫酒調下二錢

治婦人帶下赤白年月深久不瘥方

出聖惠方

凌霄花

熟乾地黄

各一兩

右件藥搗細羅為散每于食前以溫酒調下二錢

益母草散

出大全良方

治赤白惡露下不止

用益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調下

二錢日三服

廣濟治帶下病方

出大全良方

用芍藥七兩炒令黑為末每服三錢匕以酒調下

治帶下

出肘後方

用雲母粉溫水調下三錢匕立見神效

乳香散

出大全良方

治赤白帶下

用草菓一箇去皮入乳香一小塊用麴餅裏炮焦黃留性取出和麴用之為細末每服二錢陳米飲

調下重者三錢

秋霜丹

出危氏方

治赤白帶下

用真秋石為末北棗去皮煮爛為丸如梧桐子大
空心醋湯下六十九服之

治女人卒赤白下

出肘後方

取李樹東面皮去外皮炙令黃香以水三斗煮汁
去滓服之日再驗謹按李子亦去骨節間勞熱不
可多食臨水食令人發痰瘡又牛李有毒煮汁使

濃含之治蜚齒脊骨有疳蟲可從後灌此汁更空腹服一盞其子中仁能破腹研和麪作餅子空腹食之少頃當瀉矣

治赤白帶下不問老幼雖孕婦悉可服

取馬齒莧搗絞汁三合和鷄子白一枚先溫令熱乃下莧候微溫取頓服不過再作則愈

治女子赤白帶下

用匾豆花末米飲和服之

治婦人赤白帶下

出本草

三葉酸草陰乾為末空心酒下三錢

治乳婦赤白帶下

取豚子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火
炙又搵炙盡半兩末空腹細嚼陳米送下亦主勞
復臟虛者

治赤白帶下崩中

出肘後方

用牛角鰓燒灰煙斷附子以鹽水浸軟為度去皮

各等分搗羅為末每空心酒下二錢

治婦人赤白帶下久不止或因經候不斷者

出千金方

以燒狗頭和毛皮骨為末以酒服方寸匕日三二

服食前

治赤白帶下不止

出肘後方

用兔皮燒灰極盡為末酒調服立效

治崩中帶下

出本草

用孔雀糞及可傳惡瘡

療帶下

以竈下黃土水和泥作彈子丸百枚曝乾以燒熟
徹以三年酢漬丸綿裹內玉門中惟深待冷即
易之新患者三十九丸瘥久者五十九丸餘皆日知即
佳

治帶下

胡桃仁 白蜜 猪油 各等分蒸熟常服

露華湯

出適用方

治婦人赤白帶下神妙

取乾蓮房隔年者用為細末每服二錢以麝香末
飲下空心食前日三服不數日見效去麝香若不效
切不可減去

治產後赤白下久不斷身面悉腫方

用蒲黃大豆熬小麥各一升吳茱萸半升以水九
升煮取三升分三服驗

當歸煎圓

出危氏方

治婦人室女赤白帶下不止腹疼痛四

肢煩疼不欲飲食日漸羸瘦

當歸

去蘆酒浸

赤芍藥

牡蠣

煨取粉

熟地黄

酒焙蒸

阿膠

剉蛤粉炒成珠

白芍藥

續斷

酒浸各一兩

地榆

半兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服五十丸空

心用米飲送下

玳瑁丸

出聖惠方

治婦人赤白帶下不止

玳瑁

一兩

騏驎竭

半兩

乳香

半兩

沒藥

半兩

故

錦灰

三分

續斷

一兩

安息香

半兩

右件藥搗細為末以蜜及安息香熬煉和諸藥末

丸如菴豆大於食前以溫酒下二十九

生乾地黄散

出聖惠方

治婦人赤帶下不止令人體瘦心煩

生乾地黄

一兩

茜根

一兩

黃芩

一兩

當歸

一兩

炒

地榆

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右藥粗搗細羅為散每服四錢水一中盞入竹茹八分煎至六分去滓每於食前溫服

阿膠散

出聖惠方

治婦人赤帶下腹內疔痛四肢煩疼不欲

飲食日漸羸瘦宜服

阿膠

半兩搗碎
炒令黃燥

當歸

半兩剉
微炒

熟乾地黄

半兩

牡

蠣

半兩燒
為粉

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下二錢

治婦人赤帶下方

出聖
惠方

龍骨

一兩

當歸

一兩剉
微炒

白礬

一兩燒
汁盡

右件藥搗細羅為散每於食前以艾湯調下二錢

又方

出聖
惠方

熟乾地黄

半兩

牡蠣

半兩燒
為粉

艾葉

半兩
微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢
黃連散治婦人帶下若挾熱者多下赤膿

黃連

去須

竈突中煤

各一兩

右為散每服二錢食前溫酒調下日三

治婦人赤帶下不止

赤芍藥

一兩

熟乾地黄

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

又方

用桑樹東南枝白皮一握日出前取之細擘分為
三服每服以酒一中盞煎至六分去滓每於前溫
服

狗頭骨丸

出仁存方

治衝任極虛白濁白淫白帶臍腹疼痛

氣體怯弱飲食減少久無子息

黃狗頭骨一付

燒為灰存性不可白

紫石英

赤石脂

禹餘糧

代赭石

各煨醋淬

香附子

炒焦

當歸

白薇

卷柏

牛膝

附子

炮

覆盆

子

熟艾

醋煮

牡蠣

煨

熟地黄

各二兩

海螵

蛸

麝香

各錢

右為末糯米糊為丸如梧子大每服四十丸米飲

下空心食前服

酒煮當歸丸

出試效方

治癰疽白帶下症脚氣腰已下如在

冰雪中以火焙炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面如枯魚之象肌肉如刀刮削瘦峻之速也小便不止與白帶常流而不禁固自不知覺面白目青藍

如菜色目眈眈無所見身重如山行步欹側不能安地
腿膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下
痞煩心懊懷不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知
此上中下三陽空氣竭故噦嘔不止胃虛之極也其脈
沉厥緊而澁按之空虛若脈洪大而濇按之無力猶為
身寒之証况按之不鼓是為陰寒之極也若空虛則氣
血俱虛之極也

當歸 一兩

黑附子

七錢炮
去皮臍

茴香

半兩

高良薑

七錢

右剉如麻豆大以上等乾酒一升半同煎至酒盡
為度木炭火上焙乾同為細末

炒黃鹽

丁香

各半兩

全蝎

三錢

柴胡

二錢

升

麻

木香

各一錢

苦練

半兩生用

甘草

炙半錢

玄胡索

右與前四味同為細末酒煮白麵糊為丸如梧子
大每服二十九空心宿食消盡淡醋湯下忌油膩
冷物酒濕麪等

龜甲散

出聖惠方

治婦人白帶下腰膝疼痛

龜甲

一兩塗酥
炙令微黃

當歸

一兩剉
微炒

人參

三分去
虛頭

狗脊

半兩
去毛

桑耳

三分
微炒

白石脂

二兩

禹餘糧

一兩燒醋
淬七遍

吳茱萸

半兩湯浸七
遍焙乾微炒

柏葉

一兩
微炒

白芍藥

半兩
桑

寄生

半兩

桂心

半兩

厚朴

一兩去粗皮塗
薑汁炙令香熟

石件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

桑黃散治婦人風冷傷於衝任之脈經絡虛損致成白

帶下

桑黃

一兩
微炙

駝骨

一兩炙
微焦黃

當歸

三分剉
微炒

烏賊魚骨

一兩 燒灰 白芍藥 一兩 禹餘糧 一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢
龍骨散治婦人久冷白帶下臍腹痛

白龍骨 一兩 烏賊魚骨 一兩半 桂心 一兩 白芍

藥 三分 當歸 一兩 劉 禹餘糧 三兩 燒醋 熟乾地

黃 一兩 吳茱萸 半兩 湯浸七 乾薑 半兩 炮

半 遍焙乾微炒

裂剉

右件藥搗細羅為散每於食前以熱酒調下二錢
治冷白帶下

桑寄生

芍藥

柏葉

各四分

桑耳

禹

餘糧

各六分

吳茱萸

乾地黄

各八分

烏賊魚骨

五分

右為細末空心用飯飲調下二錢

補經固真湯白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不效診
得心包尺脈極微其白帶流而不止叔和八裏脈訣云
崩中月久為白帶漏下時多骨木枯言崩中者始病血
崩不已久下則血少復亡其陽故白滑之物下流不止

是本經血海時枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨以本部行經藥為引用為使以大辛甘潤之藥潤其枯燥而滋潤津液以大辛熱之藥劑補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之微苦溫之藥佐之益元氣名曰補經固真湯

炙甘草

柴胡

各一錢

乾薑末

三錢

橘皮

半錢不去

皮人參 一錢

白葵花

十六箇去心剪碎

生黃芩

一錢另剉

郁

李仁

一錢去皮尖另研如泥

右件除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃芩同煎至一盞去滓空心大熱服之候少時以早膳壓之

丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得試診其兩手尺脈必俱弦緊浮洪按之無力其證自覺臍下如水求厚衣覆以禦其寒白帶白滑之物間有如屋漏水或時有鮮血故尺脈時洪浮也屋漏水暴多下者是急弦脈寒多如洪脈時見乃熱少合而明

之急弦者此必寒水多也洪脈時出者是命門包絡之火少也黑物多赤物少合成屋漏水之狀也

當歸身

一錢半

熟地黃

白芍藥

川芎

各半

錢

阿膠烱

六分

丁香

四分

生艾葉

一錢

右川芎地黃丁香為細末當歸酒洗剉艾亦剉都作一服水五大盞先煎作一盞半去滓入膠烱再上火煎至一大盞帶熱空心候宿食消盡服之三兩服愈

治婦人白帶下不止面色萎黃遶臍冷痛

牡蠣

一兩燒為粉

當歸

一兩剉微炒

龜甲

一兩塗醋炙令黃

白馬

蹄屑

一兩炒微黃

白石脂

二兩

乾薑

一兩炮裂剉

右件藥搗細羅為散每於食前以艾葉湯調下二

錢

硃砂丸治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困

硃砂

一兩細研

白礬灰

半兩

乾薑

半兩炮裂剉

川烏頭

一兩

生去
皮臍

右件藥搗細羅為末醋煎湯為膏丸如萊豆大每
於食前以溫酒送下十九

肉豆蔻丸治婦人白帶下腹內疼痛

肉豆蔻

一兩
去殼

附子

二兩炮裂
去皮臍

白石脂

一兩

右件藥搗細羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每於
食前以熱酒下二十丸

又方

禹餘糧

一兩醋燒
淬七遍

龍骨

一兩

乾薑

一兩炮
裂剉

附子

一兩炮裂

去皮臍

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食前以溫酒下二十丸

煮附丸治婦人白帶下元虛冷

香附子

二兩
醋煮

吳茱萸

白薇

一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸米湯下空心服

白薇丸治婦人白帶不止

白薇

抹一兩

赤芍藥

烏賊魚骨

去甲各半兩

右為末煉醋一盞熬成膏丸如梧桐子大每服二

十丸食前熟水下日再

治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困

乾薑

一兩炮裂剉

禹餘糧

二兩燒醋淬七遍

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

又方

蛇床子

一兩

白芷

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢
治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困及排膿
血惡物

以白葵花一兩陰乾為末空心溫酒下二錢如赤
帶不用赤芷

治婦人白帶下

白下用禹餘糧一兩乾薑等分赤下禹餘糧一兩
乾薑半兩將禹餘糧用醋淬同薑為末空心任湯

酒下二錢

女人白帶

用天文柳搗汁井花水調服

治婦人白帶春澤湯一貼後服生料五苓散一貼庾五錢銀五錢共作一鍋鎔了授些少明砂及牙硝淬淨瀉出打小片子用足色藥在鍋內插小片子於用瓦陀蓋了煮煨如藥得下則添藥末一次却煮三兩箇時辰提鍋出候冷破鍋出牌片出再為坯關色足不走而分兩

不折足色藥

硃銅板

成者是

青鹽

各一兩

明礬

金綿礬

各五錢重

硫黃

焰硝

各二錢半重

辰砂

一錢半

膽礬

一錢

右合細末以礪瓶用時候用 杓開之法以杓關入鍋底神子在上蓋頭并瓦蓋頭發火自微至著時是藥洋著時牌洋作汁連出候取出却用淨鍋子倒子所是前是色藥及後坯關在鍋者久後多在再用所惡恐有物在內

坯關法

青鹽

黃鉛

即黃丹也

同研為末入鍋在火作汁候取面上者乾淨秤一兩用沉在底者不用礬紅兩絲是將泥礬過煨成紅礬右二件和勻研細安用時在用鹽調用

禹餘糧丸治婦人帶下五色臍腹冷痛漸加黃瘦四肢少力

禹餘糧

二兩燒醋淬七遍

白芍藥

一兩

桑蛾

一兩半微炙

黃

連

一兩
去須

當歸

二兩
剉
微炒

艾葉

一兩
微炒

芎藭

三分

川大

黃

三兩
剉
碎微炒

生乾地黃

二兩

龍骨

二兩

阿膠

一兩
剉
炙令黃燥

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐

子大不計時候以酒下三十丸

柏葉散治婦人帶下五色四肢黃瘦心煩食少

柏葉

一兩
微炙

牛角鰓

一兩
燒灰

芎藭

三分

黃耆

一兩
剉

禹

餘糧

二兩
燒醋
淬七遍

白芍藥

三分

龍骨

一兩

白朮

三分

丹參

三分

枳殼

一兩
麩炒
微黃去穰

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

禹餘糧散治婦人帶下五色久不止

一名阿膠散

禹餘糧

煨醋淬七遍

鹿茸

去毛酥炙

牡蠣

煨炙

赤石脂

各二

兩

阿膠

炙燥

當歸

剉炒

白芍藥

蒲黃

各一兩

烏賊魚骨

燒赤一兩半

右為散每服二錢食前溫酒調下

鹿茸丸治婦人帶下五色久不瘥漸加黃瘦

鹿茸

一兩去毛塗酥令炙黃

白芍藥

三分

桑我

一兩微炙

黃連

一兩 去須 艾葉 一兩 微炙 芎藭 一兩 當歸 一兩 對 阿膠 二兩

搗碎炒 禹餘糧 一兩 燒醋 令黃燥 滓七通

右件藥搗細羅為末煉蜜和搗三五百杵如梧子

大每於食前以溫酒三十丸

當歸丸治婦人帶下五色腹痛羸瘦食少

常歸 一兩 對 微炒 鼈甲 一兩 塗醋炙 川大黃 一兩 對 微炒 碎 微炒

白朮 三分 萆撥 半兩 胡根 半兩 訶梨勒皮 三分

檳榔 三分 枳殼 三分 微炒 微黃去瓢

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸梧子大
每於食前以溫酒下三十丸

續斷丸治婦人帶下五色久不止臍腹下痛

續斷

三分

丹參

三分

當歸

三分

白芷

半兩

艾葉

三分

阿膠

三分搗碎
微炒令黃燥

桑寄生

三分

馬蘭花

半兩

右件藥搗羅為末以醋浸蒸餅和丸如梧子大每
於食前以溫酒下三十丸

又方

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如菉豆大每於食前以溫酒下二十九丸

又方

早蠶蛾綿

二兩燒灰

蛇床子

末二分

麝香

一錢

右件藥同研如粉每於食前以溫酒調下一錢

餘糧散治心燥四肢痠疼所以五色腰脚臍中緊痛

禹餘糧

醋煨

地榆

阿膠

赤石脂

紫金皮

茴香

側柏

各等分

右為末每服二錢米飲調下

五灰散治崩中帶下者或因月候未止而有觸傷或產後
早起久懸廁上為風所傷各隨五臟而為五色白如涕
赤如血黃如爛瓜青如藍汁黑如衄血蓋有帶脈在腰
如帶之狀有穴名帶脈在腰之上灸此可愈其病生於
帶下故名白帶下

艾灰

礬灰

蓮蓬灰

牡蠣灰

海螵蛸

燒焦

右為末每服二錢糯米飲調下食前

神效三良散治婦人五色帶下不止

吳茱萸

黑豆同炒

寒食麪

乾薑

炮各一兩

右為散每服二錢食前溫酒調下日三服

治五色帶下方

用大豆煮湯日三服

又方

用燒馬左蹄為末以酒服方寸匕日三服

又方治五色帶下

有煮甌帶汁服一杯良

治冷熱不調或下帶水或白青黃者

用酸石榴子五枚和殼舂絞取二升汁每服五合
至二升盡即斷小兒以意服之二三合一方子殼
皆為末酒調下

白堊丸

出濟生方

治婦人白帶久而不止面生黯黥遶臍疼

痛腰膝冷痛日漸虛困產後白帶並宜服之

白堊火煨

禹餘糧

煨醋淬七次

鼈甲

醋炙

烏賊魚骨

醋炙

當歸

去芦酒浸

鵲巢灰

乾薑

炮

紫石英

火煨醋淬七次

金毛狗脊

燎去毛

附子

炮去皮臍

芎藭

各一兩

艾

葉灰半兩

香附子

醋煮二兩

鹿茸

燎去毛切片醋炙一兩

右為細末醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心用溫酒米湯任下

禹餘糧丸

一名吳茱萸丸

治婦人久赤白帶下胞絡傷敗月水

不調漸成崩漏氣血虛竭面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼

痛肢體煩痛心忪頭眩手足發熱

禹餘糧

二兩燒醋
滓七遍

白石脂

二兩

當歸

一兩剉
微炒

鼈

甲

一兩塗醋炙
微黃去裙襴

狗脊

二分
去毛

白芍藥

三分

白朮

一兩

附子

一兩塗
醋炙黃

桑寄生

一兩

柏葉

一兩
微炒

厚朴

一兩
去粗

皮塗生薑汁
炙令香熟

乾薑

一兩炮
裂剉

吳茱萸

半兩湯浸七
遍焙乾微炒

右件藥搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐

子大每於食前以熱酒下三十丸或米飲下

芍藥散

一名熟乾地黃
散出聖惠方

治婦人赤白帶下經年不差漸

漸黃瘦

白芍藥

牡蠣

煨

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮臍

黃

者

剉

龍骨

龜甲

醋炙

芎藭

各一兩

乾薑

三炮

分
白芷

半兩

熟乾地黄

焙一兩半

右為散每服二錢食前溫酒調下

鹿角膠丸

一名鹿茸丸
出聖惠方

治婦人赤白帶下不止

鹿角膠

炙燥

桑耳

微炒

乾薑

炮

牛角鰓

炙

鹿茸

去毛醋炙
各一兩半

赤石脂

白龍骨

附子

炮裂去
皮臍

右為末東蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前黃
耆湯下一方有艾葉半兩

附子散

出聖惠方

治婦人久黑白帶下臍腹冷痛腰膝麻疼

附子

一兩炮裂去皮臍

當歸

桂心

硫黃

硃砂

一兩細研

白礬灰

一兩

鹿角尖屑

一兩炒黃

禹餘糧

一兩燒醋
淬七遍

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下一錢

川椒丸

出聖惠方

治婦人久赤白帶下臍腹冷痛

川椒

二兩去目及閉口者微炒去汗

艾葉

一兩微炒

乾薑

一兩炮裂剉

白

石脂

二兩

芎藭

三分

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

熟乾地黄

二兩

伏龍肝

一兩細研入藥

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐

子大每於食前以熱酒下三十丸

誦齋散

出聖惠方

治婦人久赤白帶下不差羸困

誦齋

一枚并皮細剉

白礬

一兩研碎

硝石

一兩

硫黃

一兩研碎

已上蘇蘇白礬二味於銚子內炒令黑色然後入硝石硫黃又同炒令相入為度

禹餘糧

二兩燒醋
淬七遍

狗脊

去毛半
兩末

麝香

一錢
細研

右件藥都細研為散每於食前以溫酒調下二錢

又方

出聖
惠方

白芍藥

三分

乾薑

半兩炮
剉

地榆

一兩
剉

白礬

二兩
燒汁

盡

右件藥羅為散每於食前以粥飲調下二錢

當歸散

一名鹿角膠
散出聖惠方

治婦人白帶下不止面黃體瘦

臍冷痛

當歸

剉炒

桂

去粗皮

白龍骨

白朮

鹿角

膠

炙燥各一兩

附子

炮裂去皮臍

右為散每服二錢食前粥飲調下二錢

川大黃散

出聖惠方

治婦人赤白帶下胞中有積帶

川大黃

一兩剉碎微炒

川朴硝

一兩

當歸

一兩剉微炒

蟲蟲

一分微炒

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

桂心

半兩

右件藥搗細羅為散每於空腹以溫酒調下二錢
治婦人帶下症久不差引下惡水方

乾薑

炮

末鹽

藜

炙

杏仁

去皮尖雙
仁炒各一

兩研青礬

煉汁盡
半兩

右搗研極細東蜜和劑捻如梔子大以綿裹納陰

中即惡水下

阿膠丸

出聖
惠方

治婦人久赤白帶下

阿膠

二兩搗碎
炒令黃燥

綠礬

一兩
燒赤

白石脂

二兩

釜底墨

二兩
烏賊魚骨一兩
燒灰

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如桐子大每於食

前以熱酒下三十丸

又方

出聖
惠方

白礬

二兩燒
汁盡

釜底墨

二兩

烏賊魚骨

一兩
燒灰

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如梧桐子大每於
食前以粥飲下三十丸

又方

一名赤石脂
散出聖惠方

白芍藥

一兩

赤石脂

一兩

乾薑

一兩炮裂剉

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

又方

出聖惠方

扁竹葉

切二合

赤車使者

半兩

紅藍花

半兩

右件藥以酒二大盞煎至一盞去滓分為二服食

前服之

又方

出聖惠方

方用凌霄花二兩搗細羅為散每於食前以溫酒

調下二錢

伏龍肝散

出聖惠方

治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁

多困乏力

棕櫚

不以多少燒灰火然急以盆蓋瘞令火佳

伏龍肝

於鍋灶直下去取赤土炒

令烟盡

屋梁上塵

懸長者如無以竈頭虛空中者炒令烟盡於淨地出火毒

右等分礪和令停入龍腦麝香各少許每服二錢

溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安

一親戚婦

人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁語言聲微服諸藥不效召僕診之六脈微濡問

服何藥彼言當歸川芎瀝血諸品丹藥服之皆不效僕遂合博子濟方伏龍肝散兼白礬丸服之愈

白芍藥散

出聖惠方

治婦人赤白帶下臍腹疼痛年月深久

不差者

乾薑

三兩

白芍藥

半兩

右各炒黃色同為末空心米飲調下方寸匕又云
加香附子等分甘草減半一方不加附子甘草

治婦人赤白帶下年月深遠日漸羸瘦起止不得宜服

此方

出聖惠方

取刺薊根不限多少爆乾秤每一觔以童子小便五升浸一伏時爆乾搗細羅為散每日空心及晚

食前以暖酒調下二錢

桑耳散

出聖惠方

治婦人帶下五色無問新舊

方見本門崩中漏下類

艾葉散

出聖惠方

治婦人赤白帶下日夜不止體黃瘦不思

飲食

方見本門崩中漏下類

搗鼻香

出大全良方

治婦人子宮久冷赤白帶下

牡蠣

煨

黃狗頭骨

煨

紫稍花

韶腦

母丁香

蛇床子

故破紙

桂心

等各

分

右為細末煉蜜丸如雞頭大臨時用一粒

治赤白帶下骨立者

出大全良方

用地榆一觔先剉用水三斗煮至一半去滓再

煎如稠餈絞濾空心服三合日二服

醋煎丸

出楊氏家藏方

治血海久冷赤白帶下月候不調臍腹

刺痛

高良薑

劉碎八油炒黃二兩

乾薑

炮二兩

金狗頭脊

去毛附二兩

子

四枚重六錢炮去皮臍尖

右為細末別用艾葉末二兩醱醋三升煎至一升半次入麴一兩再熬成膏和前藥末為丸如梧桐子大每服三十丸淡醋湯下空心食前

一方

出鮑氏方

蓮蓬

燒灰一倍

白礬

研末半倍

右米飲調下

赤白帶下十年者亦愈

出鮑氏方

春綿

棕櫚

茅花

敗荷

蓮蓬

帽紗

與綿同燒

百草霜

右為末每服二錢入腦麝溫酒醋湯下

茱萸浴湯

出楊氏家藏方

治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月

水崩漏淋瀝不斷

杜仲

絲炒去

吳茱萸

湯洗七遍

蛇床子

丁香皮

五味子

各一兩

木香

半兩

丁香

半兩

右剉如麻豆大每用半兩以生絹袋盛之水三大

碗煎數沸乘熱薰下部通手淋浴早晚兩次薰洗

金銀丸

出楊氏家藏方

治婦人衝任不足子宮久寒肢體煩疼

帶下冷病

牡蠣

一兩煨粉

硫黃

二兩生用

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服三十丸米飲

下食前服

玄胡苦練湯

出試效方

治臍下冷撮痛陰冷大寒帶下

方見本門

胎前雜

病類

調經固真湯

出試效方

冬後一月微有地泥水泮其白帶再

有陰戶中寒立此方一服而愈

麻黃

不去節半錢

杏仁

二箇

桂枝

少許

炙甘草

半錢

黃耆

七分

人參

當歸身

各半錢

高良薑

一錢

白朮

半錢

蒼朮

二分

澤瀉

羌活

各一錢

防風

二分

柴胡

四分

獨活

藁本

各二分

升麻

生黃芩

各五分

乾薑

炮二分

白葵花

七朵去萼

右呔咀如麻豆大除黃芩麻黃各另外都作一服
先以水三大觔半煎麻黃一味令沸掠去沫入餘
藥同煎至一觔七分再入生黃芩煎至一觔去滓
空心宿食消盡日高時熱服之待一時許可食早
飯

桂附湯

出試效方

治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂

一錢

附子

三錢

黃蘗

半錢為引用

知母

半錢

不思飲食加五味子煩腦面上麻如蟲行乃胃

中元氣極虛加黃芪一錢五分人參七分炙甘草升麻五分

右以咀都作一服水二觔煎至一觔去滓稍熱服食速一方如少時常飽有時似腹脹者加白芍藥半錢

升陽燥濕湯

一名助陽湯
出衛生寶鑑

治白帶下陰戶痛控心而急

痛身黃皮膚燥身重如山陰冷如水

防風

一錢

柴胡

一錢半

良薑

一錢

乾薑

半錢

橘皮

半錢

白葵花 二錢

生黃芩

半錢一作黃柏

郁李仁 一錢

甘草 一錢

右剉如麻豆大分作二服水二觔煎至一觔去滓稍熱服食前少時以美膳壓之

當歸附子湯

出衛生寶鑑

治臍下冷痛赤白帶下

良薑

一錢

乾薑

一錢

附子

一錢

柴胡

七分

升麻

五分

當歸 二錢

蝎稍

五分

炙甘草

三分

炒鹽

三分

黃蘗

少許為引用

右為粗末每服五錢水五觔煎至一觔去滓稍熱服或為細末酒糊為丸亦得

固真丸

出試效方

治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目

中溜火壅其上視物眈眈然無所見牙齒惡熱飲痛須得黃連細末擦之乃止惟喜乾食六惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上益走於標故上壅而目中溜火腎水浸肝而上溢致目眈眈而無所見齒惡熱飲者是少陽陽明經伏火也

白石脂

一錢以火燒赤水飛研細日乾

乾薑

炮四錢

黃蘗

酒製

白

芍藥

各半錢

白龍骨

二錢

柴胡

一錢

當歸身

酒製二錢

前證乃寒濕為之也治法當大瀉寒濕以丸子藥治之故曰寒在下焦治主病宜緩以時大忌湯散以白石脂白龍骨以枯其濕以炮乾薑大辛熱瀉寒水以黃蘗之大寒為佐用又為鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後亦為之伏其所生先其所因之意其瀉齒中惡熱飲也以柴胡為本經之使

以芍藥半錢導之恐辛熱之藥太甚損其肝經故
微瀉之當歸身辛溫大知其血脈此用藥之法完
備矣

右除石脂龍骨水飛研外同為極細末水煮稀麪
糊為丸鷄頭子大日乾空心候宿食消盡煎百沸湯
令大溫多用送下無令胃中停滯待少時以早膳
壓之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物酒與溫麪

小陰丹

朱氏集
驗方

治婦人赤白帶下月候不調諸虛不足

當歸

白芍藥

各四兩

白朮

茯苓

藁

本

白芷

延胡索

各一兩

熟地黄

酒蒸

牡

蠣

草鞋包煨各半兩

人參

沒藥

各二兩

甘草

炙

南

木香

各一兩

赤石脂

煨七錢

大附子

一兩炮去皮臍

蚕退紙

燒以多為貴

右細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心酒服

石脂散

朱氏集驗方

治白冷精帶下陰脰脫出或青黑黃白

彈下攻痛腹悶頭旋眼昏耳聾啾啾痰上壅

赤芍藥

炒四兩

乾薑

香附子

二兩

右為細末每服三錢空心酒下如帶赤冷即用陳

米飲下煎阿膠艾湯尤炒若要順氣加茴香

妙應丹

出衛生家寶

治婦人一切冷氣赤白帶下

吳茱萸

當歸

艾葉

蒼朮

禹

餘糧

火煨淬為末另

右等分用米醋煮數沸焙乾仍用醋糊丸如梧子

大每服五十丸醋湯下

治婦人脫陰白帶下無藥可治服之此藥立有應

出衛生家

實

附子

七錢去皮火生

黃狗頭

燒灰四兩

白礬

一兩枯

綿灰

半兩

棕櫚灰

半兩

腦麝

少許

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十九空心用麝香醋湯吞下一日三服

堅中丸

出十便良方

治室女白帶下

半夏

一兩

猪苓

二兩剉別為末

右同半夏炒令黃色取半夏為末水糊為丸如梧
桐子大焙乾白湯下二十九不以時留猪苓末養
此丸子

鹿角膠散治婦人白帶下不止面色痿黃遶臍冷痛

鹿角膠 白龍骨 附子 桂心

當歸 白朮

各一兩

右搗羅為散每服於食前以粥飲調下二錢

乾薑丸治婦人久赤白帶下臍脹冷痛方

乾薑

阿膠

伏龍肝

細研各一兩

白石脂

熟乾地黄

各二兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大

每服食前以熱酒下三十丸

海蛤丸

出王氏博濟方

取小腸積敗婦人赤白帶下并五淋

舶上茴香

半夏

芫花

醋炒令乾

紅娘子

去麴

頭足畧炒

玄胡索

川苦楝

硃砂

去砂石取霜用

海

蛤

芫青

去上頭足畧炒各等分

右件藥味一處細研抄出羅為末醋煮麵糊丸桐
子大用硃砂為衣每服一丸鹽湯下婦人醋湯下
五淋生薑湯下心氣痛生薑醋湯下取惡物為效
治婦人血海虛冷赤白帶下肌肉消瘦臍氣虧損弱絕
無骨肉宜服此方六腑熱不可喫

出護
命方

石斛

去根

白芷

萆薢

狗脊

去毛

益智

子

去皮

山茱萸

牡蠣

火煨

杜仲

去皮

赤石

脂

龍骨

各半兩

艾葉

半兩

甘草

藁本

各一

分
當歸 一兩

右為細末每服三錢水一盞二分大棗三枚同煎
四五沸空心去滓喫

白薇丸

出衛生家寶方

治婦人血臟氣弱四肢倦怠不思飲食

氣冷微疼赤白帶下血崩婦人一切諸病皆治

白薇

五兩
淨洗

地黃

二兩
洗焙

牛膝

酒浸一宿焙

山茱萸

焙

肉桂

不見火

白朮

訶子皮

石斛

附

子

炮熟去皮尖

黃連

乾薑

肉豆蔻

生

人

參

焙

華撥

焙

栴榔

生

茯苓

焙

沒藥

研生

麒麟竭

生

大黃

焙

肉蓯蓉

去皮毛切焙

木香

焙

薯蕷

焙已上各一兩

當歸

一兩酒浸一宿焙

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心

日午鹽酒下鹽湯亦得

主婦人帶下

出本草

以榆莢和牛肉作羹食之

破血壅脹帶下崩中不止者

出本草

以麻根洗淨搗碎用水煮服之效

治婦人帶下漏下

出本
草

以淡菜羹食之任意

治女子帶下

出本
草

以白殭蚕七枚為末用酒調方寸匕服立效

治婦人赤白帶下

出本
草

以薤作煮食之

治婦人赤帶下

出本
草

用懸鉤根皮濃煮服之

治婦人帶下五色俱治之

出本草

取黃磚石燒令微赤熱以五味和作煎餅七箇
安磚上以黃芩萋傳麩上又以布兩重墊令病
人坐下令藥氣入腹布上面有蟲出如蚕子不
過三五度差

治女子帶下便溺不利

出本草

以雀卵白和天雄兔絲子末為丸空心酒下五丸

治赤白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困

白帶下用

禹餘糧

一兩味甘寒用醋淬過研為末

乾薑

一兩味辛大熱研為末

赤帶下用

禹餘糧

一兩味甘寒用醋淬過研為末

石薑

半兩味苦溫赤名淬補研為末

右二方各隨證令和用藥每服二錢空心溫酒調

下

治月候湛濁赤白帶下多年不差者

用石鷺子淨洗刷去泥土杵羅為末以磁石協去
杵頭鉄屑更以堅甕鉢內以硬乳槌研細水飛過
取白汁如甘乳者澄去曝乾服半錢至一錢清飯
飲調下溫水亦得須常服勿令歇服之及一月諸
疾皆愈

赤白濁

附論

夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不升
降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰

陰為洩便之道胞冷腎損故有白濁白淫宜服局方金鎖正元丹或因心虛而得者宜服平補鎮心丹降心丹威喜丸若因思慮過當致使陰陽不分清濁相干而成白濁者然思則傷脾故也宜服四七湯吞白丸子此藥極能分利更宜小烏沉湯每貼加茯苓一錢重益智二十八枚去殼碾鹽煎服

二豆散

出危氏方

治耳鳴心躁腰脚疼重腹內虛鳴臍下

冷痛頻下白水如泔湛濁

白豆蔻

肉豆蔻

丁香

巴戟

丁皮

白茯苓

蒼朮

桂心

黑

附

火煨各一兩

白朮

人參

山藥

桔梗

茴香

粉草

各五錢

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉三片煎空心服溫服

鹿茸丸治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁

方見本門前小

類便數

勝金丸

出危氏方

治渾身壯熱頭疼臍下疔痛下淡紅水

當歸

去尾

白芍藥

鹿茸

燎去毛酒炙

鼈甲

川芎

白朮

大艾

炒

側柏葉

赤

石脂

醋煨

川白芷

烏賊魚骨

各等分

右為細末蜜丸如龍眼大每服一丸空心鹽酒下

或敗棕燒灰調酒吞下

薑黃散

出大全良方

治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片子薑黃

二兩

大附子

炮一兩

赤芍藥

柳桂

紅藍子

三稜

各半兩

牡丹皮

芫花

醋浸炒

木香

郁李仁

去皮

沒藥

各一分

右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以水七分酒三分同煎至七分熱服

內金鹿茸丸

出醫方集成

治婦人勞傷血脈胞絡受塞小便

白濁晝夜無度臍腹疼痛腰膝無力

黃耆

鷄內金

牡蠣

鹿茸

遠

志

肉蓯蓉

五味子

龍骨

桑

螵蛸

附子

各等分

治白濁及婦人赤白帶下

以猪脂入白礬一塊安在鍋銚中煨熟以白礬屎
清泡吃

治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁

用鹿茸屑炒黃為細末空心溫酒調服二錢

又方

用鷄胫炙為末空心酒調二錢一分


婦人白濁

出永類
鈴方

用百草霜一錢入椒末炒鹽少許猪肝一片三指

大批開入上藥紙裏慢火煨熟細嚼以濁酒空心

下食後服酸棗仁湯



普濟方卷三百三十一